

Warszawa, 9.03.2009

**ZALECENIE Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu
Szczepień Ochronnych w sprawie obowiązkowych szczepień przeciwko
pneumokokom i ospie wietrznej dzieci narażonych w sposób szczególny
na zakażenie realizowanych w ramach obowiązującego Programu
Szczepień Ochronnych**

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z czerwca 2008 r. oraz komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 25.09.2008 r. wprowadzono nowe bezpłatne szczepienia do Programu Szczepień Ochronnych dla dzieci szczególnie narażonych na zakażenie (lista szczepionek i chorób poniżej).

Zwracamy się do specjalistów z poszczególnych dyscyplin medycznych o pilne wdrażanie szczepień w wymienionych grupach ryzyka w porozumieniu z lekarzami POZ. Do zaszczepienia nie jest konieczne wydawanie specjalnych skierowań, jeśli dziecko posiada ustalone rozpoznanie. Szczepionki są dostępne w Powiatowych Stacjach Sanitarно-Epidemiologicznych nieodpłatnie. Realizacją tych szczepień zajmują się lekarze POZ sprawujący opiekę nad dzieckiem w miejscu zamieszkania dziecka lub specjalistyczne jednostki sprawujące opiekę nad pacjentami z grup ryzyka. Szczepienie należy rozpocząć najwcześniej jak jest to możliwe, zgodnie z zarejestrowanym schematem.

Szczepienia przeciwko pneumokokom:

a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia

- po urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekami płynu mózgowo-rdzeniowego lub

chorujące na:

- przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia,
- schorzenia immunologiczno-hematologiczne,
- małopłytkowość idiopatyczną,
- ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
- asplenię wrodzoną lub po splenektomii,
- zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej strukturopatii,
- pierwotne zaburzenia odporności,
- zakażone HIV,
- przed planowanym przeszczepieniem narządów wewnętrznych lub po przeszczepieniu szpiku lub wszczepieniu implantu ślimakowego,

b) dzieci przedwcześnie urodzone do ukończenia 1 roku życia chore na dysplazję oskrzelowo-opłucną;

Szczepienia przeciwko ospie wietrznej

a) dzieci do ukończenia 12 roku życia: z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby, z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, zakażone HIV, przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,

b) dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych powyżej, które nie chorowały na ospę wietrzną.

W imieniu Zespołu

Prof. dr hab. med. Anna Dobrzańska
Przewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów
ds. Programu Szczepień Ochronnych
Specjalista krajowy z dziedziny pediatrii